

ISTRUZIONI DI UTILIZZO PER PROTESI MOBILE IN RESINA PARZIALE CON GANCI o TOTALE

Il manufatto protesico che Le è stato applicato è un dispositivo medico su misura ed è stato realizzato dall'odontotecnico che fornisce questo Studio odontoiatrico, sulla base della prescrizione formulata per iscritto dallo studio medesimo e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 46/97 (Direttiva C.E. 93/42) sui dispositivi medici.

Anche se la ricerca ha consentito di sviluppare materiali dentali di grande efficacia e sicurezza per la fabbricazione di protesi dentarie tali dispositivi non sono i ritrovati alternativi ai denti naturali, ma solo la soluzione sostitutiva in caso della loro mancanza.

Pertanto la protesi applicata provvede a restaurare il suo organo della masticazione senza tuttavia riportarlo alla funzione di un organo interno.

Al fine di consentirle un uso sicuro ed adeguato della sua protesi è opportuno che consideri attentamente le seguenti indicazioni.

- La protesi che Le è stata applicata va adeguatamente mantenuta e controllata periodicamente monitorandola ogni sei mesi;
- L'igiene domiciliare che Le è stata insegnata va mantenuta scrupolosamente per poter consentire una buona durata alla protesi ed un corretto stato di salute al suo apparato masticatorio.
- La protesi è stata costruita per una funzione masticatoria sostitutiva, non è adatta per carichi eccessivi o traumi violenti (schiacciare noci o torrone duro, aprire tappi, spezzare oggetti, ecc) o cibi gommosi (caramelle o gomme americane). Nel caso si riscontrasse qualsiasi anomalia nella funzione masticatoria della protesi è necessario che contatti lo studio per ulteriori informazioni.
- La protesi potrebbe necessitare di correzioni e controlli dopo i primi tempi di utilizzo.
- Ogni protesi, nei giorni successivi all'applicazione, può dare sensazioni o impressioni nuove.
- Nel caso la protesi acquistasse strane colorazioni o desse strani sapori in bocca è pregato di comunicarlo al primo controllo presso lo studio.
- La protesi totale appoggia su una gengiva umida e scivolosa senza denti infissi nell'osso; la forza masticatoria potrà essere ridotta e dovrà attendere alcune settimane per imparare a portare e a utilizzare correttamente la sua protesi.
- Inizialmente avrà una sensazione di pienezza ed un aumento della salivazione che caleranno lentamente con il tempo e con l'abitudine.
- Eventuali difficoltà nel parlare diminuiranno velocemente facendo esercizi di lettura ad alta voce.
- Non si aspetti di masticare con facilità ed efficienza immediatamente; occorre imparare ad usare la nuova protesi e ciò richiederà tempo e pazienza. Alcuni pazienti imparano prima di altri.
- La masticazione andrà migliorata gradualmente iniziando con cibi teneri e friabili posti tra i denti posteriori, contemporaneamente a destra e a sinistra per aiutare la stabilità della protesi ed aumentare l'efficienza masticatoria.

- Nel caso si creassero sulle gengive delle piccole ulcere dovute all'appoggio della protesi telefoni in studio per gli opportuni ritocchi e **non attenda inutilmente** una guarigione che non arriverebbe.
- La protesi totale inferiore può avere problemi di stabilità e ritenzione, questo può essere dovuto ad una ridotta area di appoggio, all'inserzione dei muscoli o ad una posizione non appropriata della lingua. Un aiuto potrà trovarlo dall'utilizzo delle comuni **paste o creme adesive** reperibili in tutte le farmacie.
- Nel caso la protesi perdesse consistentemente in stabilità od in adesione rispetto alla prima applicazione, prenda appuntamento per un controllo per valutare la necessità di un eventuale **ribasatura**.
- **Esami periodicamente la bocca allo specchio, controllando le guance, la lingua, le gengive ed il palato. Se osservate ferite o altro contatti lo studio per un controllo.**
- La protesi **è da togliere e da pulire dopo ogni pasto** od ogni spuntino utilizzando uno spazzolino per protesi totale e del dentifricio o del normale sapone, sciacquandola poi molto bene. Nel lavare la protesi, ponga massima attenzione al non farla cadere. Le "pastiglie disinfettanti" agiscono su di una protesi pulita quindi le utilizzi solo se la protesi è ben spazzolata.
- Nel caso di protesi con ganci, ricordare di spazzolare in modo particolare i denti dove poggiano i ganci.
- Le resine di cui è composta la protesi non vanno pulite con solventi o abrasivi o con spazzole metalliche.
- Nel caso rompesse la protesi o un margine della stessa chiami lo studio per la riparazione, non utilizzi colle o resine che ne comprometterebbero l'integrità.

Dr Michele Caruso